




コレステロール(mg/dl)



血漿粘性度(mPa/s)




フェブリノーゲン (mg/dl)




ポーレンリフによる血液変化

東京医科歯科大学難治疾患研究所 王黎曼(医博)


善玉コレステロール (mg/dl)




TNFα(腫瘍壊死因子)減少
66.7%減



抗酸化酵素 (%)



Cortisol (μ g/dl)









ポーレンリフの腫瘍壊死因子への効果 (TNF-α)

年齢	性別	摂取前	摂取後		年齢	性別	摂取前	摂取後		年齢	性別	摂取前	摂取後	
22	F	65	40	↓	32	F	44	46	↑	25	F	23	14	↓
19	F	51	37	↓	26	F	85	78	↓	24	M	27	20	↓
22	F	13	24	↑	24	F	32	37	↑	30	M	44	54	↑
26	F	42	28	↓	20	M	81	59	↓	27	F	45	23	↓

ポーレンリフによる血液変化

東京医科歯科大学難治疾患研究所 王黎曼(医博)



Effect of Pollen Riff on the Tumor Necrosis Factor Alpha (TNF-α)

Age	Sex	Before	After		Age	Sex	Before	After		Age	Sex	Before	After	
22	F	65	40	↓	32	F	44	46	↑	25	F	23	14	↓
19	F	51	37	↓	26	F	85	78	↓	24	M	27	20	↓
22	F	13	24	↑	24	F	32	37	↑	30	M	44	54	↑
26	F	42	28	↓	20	M	81	59	↓	27	F	45	23	↓